

Tabaquismo pasivo: A exposición ao fume ambiental do tabaco

A exposición ao fume ambiental pode causar graves problemas de saúde. aumenta ata un **30 % o risco de sufrir enfermidades cardíacas** ou pode levar a desenvolver unha enfermidade pulmonar crónica.

Os nenos, os máis vulnerables, poden sufrir un **50 % máis de otite**, un **20 % máis de crises asmáticas** ou un **30 % máis de infeccións respiratorias** ca os nenos non expostos.

Menores expostos ao fume do tabaco = x2. O risco de padecer cancro de pulmón comparado con aqueles que non están expostos.

O fume da cachimba ten tantas substancias nocivas coma o dos cigarros.



NO FOGAR

Algo menos da metade dos mozos e mozas entre 14 e 18 anos conviven con persoas que fuman a diario (41,4 %).
7 de cada 10 fumadores recoñecen que fuman no domicilio na presenza de menores.



NAS TERRAZAS E LUGARES DE OCIO AO AIRE LIBRE

Só un 11 % dos fumadores declara que non fuma nada na presenza de menores en espazos tales como as terrazas abertas e a vía pública.



NOS CENTROS EDUCATIVOS E NOS PARQUES

Algo menos da metade dos estudantes (43,5 %) afirma que viu como o profesorado fumaba tabaco dentro do recinto do centro educativo nos últimos 30 días e practicamente 2 de cada 3 estudantes (64,7 %) confirman que viron fumar outros alumnos do centro dentro do recinto.
Un 46 % dos accesos aos centros escolares e un 41 % dos parques infantís teñen nicotina ambiental procedente do fume do tabaco e das cachibas dos cigarros.

#RespiroLibre en Cenlle




Podes votar ó espazo que
desexes liberar de fume en:




% Fumadores diarios por ingresos mensuales netos do fogar

O consumo diario de tabaco é superior nos fogares con ingresos mensuais máis baixos.



Fumadores diarios por comunidades e cidades autónomas en 2020

Porcentaxe de persoas de 15 e máis anos.




Total Nacional: 19,8%


O tabaco é o responsable de 1 de cada 3 casos de cancro




Ata 16 tipos distintos de cancro están relacionados co tabaco. É responsable de:




dos casos de vexiga



dos casos de orofarinxe



dos casos de esófago



dos casos de boca

O tabaco é o responsable do 82% dos casos de cancro de pulmón e do 84% dos casos de cancro de larinxe.